


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ


Приведенные цифры и таблица могут быть использованы для оценки нормального давления крови у недоношенных младенцев. Гипотензию обычно не следует лечить при отсутствии других симптомов недостаточности сердечного выброса (нарушенный кровоток кожи, метаболический ацидоз, анурия).

Средние и 95% границы значений давления крови у младенцев в первые 12 часов после рождения. Таблица 1


Систолическое
(мм рт.ст.)



Среднее
(мм рт.ст.)



Диастолическое
(мм рт.ст.)



Пульсовое
(мм рт.ст.)




Таблица 2

Нормальные значения систолического артериального давления (мм рт.ст.) в первые 3-96 часов у бессимптомных новорожденных с низкой массой тела.

Вес Тела, кг	Гестационный возраст в неделях													
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
0.80	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50
0.90	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51
1.00	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51
1.10	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52
1.20	46	47	47	48	48	49	49	50	51	51	52	52	53	53
1.30	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54
1.40	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55
1.50	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55
1.60	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56
1.70	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57
1.80	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58
1.90	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59
2.00	53	53	54	54	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60
2.10	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60
2.20	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61
2.30	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62
2.40	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63

Добавьте для постнатального возраста:

Часы	3-7	8-12	13-18	19-24	25-32	33-40	41-54	55-89	90-96
мм рт. ст.	2	3	4	5	6	7	8	7	

Жирный контур включает область значений, относящихся к весу тела/гестационный возраст исследованной популяции.

Литература:

Moscoso P, Goldberg RN, Jamieson J, Bancalari E. Spontaneous elevation in arterial blood pressure during the first hours of life in the very-low-birth-weight infant. J Pediatr 1983; 103:114-117.

Tan KL. Blood pressure in very low birth weight infants in the first 70 days of life. J Pediatr 1988; 112:266-270.

Versmold HT, Kitterman JA, Phibbs RH, Gregory GA, Tooley WH. Aortic blood pressure during the first 12 hours of life in infants with birth weight 610 to 4,220 grams. Pediatrics 1981; 67:607-613.