

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

III. Процедура

А. Скрининг развития проводится практикующими педиатрическими медицинскими сестрами под контролем педиатра. В городе Айова пациенты осматриваются в Поликлинике при университетском Госпитале. Осмотры проводятся в возрасте 4, 9, 18 и 30 месяцев. При каждом посещении проводится физическое и психическое обследование с выполнением теста Денвер II.

Б. Младенцы более высокого риска или требующие более детальной оценки могут быть записаны на прием к неонатологу Неонатальной Клиники. Примерами таких детей могут быть: младенцы с нерешенными медицинскими проблемами, такими как, бронхолегочная дисплазия или выраженное внутрижелудочковое кровоизлияние, и младенцы, выписанные на кислородной поддержке, мониторинге или дыхательных analeптиках. В Неонатальной клинике неонатолог и практикующая сестра наблюдают за ребенком в сотрудничестве с местным врачом до тех пор, пока не станет возможным полностью предоставить лечение ребенка врачу по месту жительства.

В. Младенцы, которым необходима программа наблюдения после выписки, должны быть определены сестрой или врачом-резидентом в процессе лечения в госпитале. В таком случае родители информируются о наличии службы наблюдения.

ИММУНИЗАЦИЯ МЛАДЕНЦА В ГОСПИТАЛЕ

I. Все младенцы, доношенные и недоношенные, находящиеся в госпитале до 2х месячного возраста вследствие длительного лечения, должны быть обсуждены на предмет начала иммунизации.

II. В два; четыре и шесть месяцев после рождения назначается *Tetramune* (0,5 мл в/м), полио-вакцина (см п. III ниже). Вакцина Гепатита В (0,5 мл в/м) вводится в первые 2 месяца после рождения и затем через каждые 2 последующих месяца; всего три дозы.

III. Если младенец остается в госпитале; вводится одна доза (0,5 мл) инактивированной (Salk) полио-вакцины подкожно. Если младенец выписывается; дается одна доза тривалентной полио-вакцины через рот непосредственно перед выпиской.

IV. Младенцы с хроническим заболеванием легких в возрасте 6 мес. и старше должны получать противогриппозную вакцину каждый сезон (также как и их семья и персонал, ухаживающий за ними в госпитале).

V. До назначения иммунизации необходимо получить письменное согласие родителей.

VI. Надо отметить иммунизацию в форме а-9 "Регистрация вакцинации и диагностического скрининга" в карте младенца и выдать родителям карту иммунизации с отметкой даты и вакцины. Напомните родителям; когда должна будет проводиться следующая вакцинация.

VII. Необходимо включить данные об иммунизации в промежуточные, переводные и выписные сводки.

ЛИТЕРАТУРА:

Bernbaum JC, Daft A, Anolik R, et al. Response of preterm infants to diphtheria-tetanus-pertussis immunizations. J Pediatr 1985; 107: 184-188

American Academy of pediatrics Committee on Infectious Diseases. Report of the Committee on Infectious Diseases. (23rd ed.) Elk Grove Village: American Academy of Pediatrics, 1994; 51-52.