

МАНИПУЛЯЦИИ, ПРОЦЕДУРЫ

ЦИРКУМЦИЗИЯ

Дискуссионные показания к циркумцизии длительно обсуждались в литературе; о ней идет речь в недавних публикациях, включая **Отчет комиссии по циркумцизии** (Report of the Task Force on Circumcision, Pediatrics 1989; 84:388-391) и **Статус циркумцизии у новорожденных** (The Status of Circumcision of Newborns, NEJM, 1990; 322:1308-1315). Прилагаемая выдержка взята из правил ГКУА.

I. Каковы потенциальные преимущества циркумцизии у новорожденных?

Головку пениса легче содержать в чистоте если у мальчика выполнена циркумцизия. Вследствие простоты мытья, инфекции, которые могут встретиться у неоперированных мальчиков или мужчин при плохом уходе, не встречаются у подвергнутых циркумцизии. Циркумцизия предотвратит ряд состояний, приводящих к скоплению жидкости и выделений вокруг крайней плоти и головки, равно как и проблему фимоза, при котором невозможно вывести головку. Циркумцизия у новорожденного защищает от развития впоследствии рака полового члена, хотя это крайне редкое заболевание. В соответствии с новыми предварительными данными частота заболеваний мочевыделительной системы у мальчиков может быть снижена при выполнении циркумцизии в периоде новорожденности.


II. Каков потенциальный риск и неудобство циркумцизии?

Непосредственную опасность представляют кровотечения, случайное повреждение пениса и инфекция. Хотя циркумцизия обычно считается безопасной процедурой, в редких случаях эти или другие осложнения могут привести к серьезным проблемам и даже смерти. Воспаление наружного отверстия уретры (меатит) более характерно для подвергнутых циркумцизии мальчиков. Несмотря на то, что процедура сравнительно непродолжительна, новорожденный чувствует некоторую боль и дискомфорт.

III. Необходима ли местная анестезия?

Традиционно циркумцизия у новорожденных выполнялась без анестезии из-за заблуждения, что новорожденный не ощущает боль. В последние годы разработана техника проведения местной анестезии для этой процедуры, но тем не менее, это не везде принято. Местная анестезия проводится путем введения лекарства в нервные стволы основания пениса. При правильном выполнении эта процедура уменьшит боль и поведенческие нарушения младенца. Осложнения, связанные с местной анестезией, редки и состоят в основном из кровотечения и повреждения кожи в месте инъекции. Местная анестезия добавляет элемент риска процедуре и поэтому не применяется у значительного числа младенцев.

Места для инъекции при блокаде дорзального нерва пениса.



IV. Циркумцизия методом зажима Gomco подробно описан в главе "Circumcision" на стр. 378-388 в "Atlas of Procedures in Neonatology, 2nd edition. Fletche and MacDonald (eds), 1993, JB Lippincott Co., Philadelphia