

## НАДЛОБКОВАЯ ПУНКЦИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

I. Показания: Пункция мочевого пузыря для получения стерильной мочи для посева. Надлобковая пункция не показана для латексного исследования на антиген стрептококка группы В (достаточно взятие пробы из пакета).

II. Будьте уверены, что в течение часа не было опорожнения пузыря, и что в нем скопилось достаточное количество мочи. Ребенок лежит в позе лягушки с разведенными ногами. Лобковая область трижды обрабатывается спиртовыми шариками. Игла 25G со шприцем 3 мл направляется перпендикулярно к коже непосредственно над (0,5 см) симфизом по срединной линии и вводится до павильона. У доношенных младенцев иногда используется игла 22G (нет необходимости введения до павильона). Игла вынимается медленно с небольшим оттягиванием поршня шприца.

III. После процедуры может наблюдаться незначительная гематурия, но другой риск минимален. Редкие осложнения включают гематому стенки мочевого пузыря, повреждение сосуда на передней стенке пузыря, перфорацию полого органа, остеомиелит лобковой кости или абсцесс брюшной стенки.

IV. Если моча не получена, к ребенку надо подсоединить мочеприемник и повторить попытку через час. При невозможности получения пробы, может потребоваться взятие пробы через катетер, но эту процедуру выполнять более сложно и более рискованно.

